



Дифференциальные признаки острого и хронического кашля



ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ»

127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1, каб. 609, тел.: 8 (495) 642-82-34, 8 (495) 642-82-35

Основные причины острого кашля¹

Острый кашель
(продолжительностью до 3 недель)¹


Непродуктивный (сухой) кашель

- Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)
- Риниты и синуситы (аллергические и неаллергические)
- Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)
- Сердечная астма, перикардит
- Сухой плеврит
- Наружный отит
- Пневмоторакс
- Аспирация инородного тела
- Коклюш

Продуктивный кашель

- Острый бронхит, пневмония

РАЗВИТИЕ ОСТРОГО ВИРУСНОГО БРОНХИТА



ВАЖНО Бронхообструктивный синдром выявляется у **40 % взрослых** больных с острым бронхитом без сопутствующих заболеваний легких³

Основные причины хронического кашля¹

Хронический кашель
(продолжительностью 3–8 недель и более)

Непродуктивный (сухой) кашель

- Бронхиальная астма (кашлевой вариант)
- Хронические воспалительные заболевания носоглотки
- Интерстициальные заболевания носоглотки
- Прием ИАПФ
- Объемные процессы в средостении
- Психогенный кашель

Продуктивный кашель

- Хронический бронхит, бронхоэктазии, астма, рак бронхов, застойная левожелудочковая недостаточность



в среднем
20 %
обследованного
населения
страдает хроническим бронхитом

ВАЖНО

Хронический бронхит приводит к дыхательной недостаточности, легочному сердцу и мучительной гибели пациентов²

¹ Синопальников А. И., Клячкина И. Л. Дифференциальный диагноз кашля // Пульмонология. 2004. Т. 6. № 10.

² Новиков Ю. К. Принципы лечения хронического бронхита // РМЖ. 1998. № 4. С. 1.

³ Кулаев В. И. и соавт. Оценка эффективности терапии острого бронхита комбинацией муколитика β2-агониста по сравнению с монотерапией муколитиком в реальной общей врачебной практике // Доктор.ру. Кардиология. Терапия. 2017. № 5 (134). С. 16–18.

ДЖОСЕТ®

Свобода дышать
без кашля

- Предупреждает приступ удушья*
- Уменьшает вязкость мокроты*
- Улучшает отхождение мокроты*
- Уменьшает раздражение слизистой дыхательных путей*



Краткая инструкция по применению препарата Джосет. Рег. номер: ЛСР-001953/07. Лек. форма: сироп. Состав: 5 мл сиропа содержат: активные вещества: салбутамол сульфат 1,205 мг (что эквивалентно салбутамолу 1 мг), бромгексин гидрохлорид 2 мг, гвайфенезин 50 мг, ментол (левоминтол) 0,5 мг, вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат 7,5 мг, натрия пропилпарагидроксибензоат 5,0 мг, сахароза 2500,0 мг, пропиленгликоль 625,0 мг, натрия сахаринат 5,0 мг, сорбиновая кислота 10,0 мг, глицерол 250,0 мг, лимонной кислоты моногидрат 1,4 мг, сорбитол (некристаллизирующийся) жидкий 1315,0 мг, краситель закатино-желтый 0,15 мг, вода очищенная до 5 мл. **Фармакотерапевтическая группа:** откаривающее средство. **Показания к применению:** острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты: бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких, хроническая обструктивная болезнь легких, трахеобронхит, пневмония, пневмококиоз, туберкулез легких. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав, тахикардия, миокардит, аортальный стеноз, декомпенсированный сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), желудочно-кровотечение, беременность, период лактации, непереносимость фруктозы. **Побочные действия:** со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушения сна, сонливость, тремор, судороги. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, обострения язвенной болезни, повышения активности печеночных трансаминаз (крайне редко). Со стороны ССС: тахикардия, снижение АД, коллапс. Со стороны мочевыводящей системы: окрашивание мочи в розовый цвет. **Аллергические реакции:** кожная сыпь, крапивница, парадоксальный бронхоспазм. **Способ применения и дозы:** внутрь. Детям: в возрасте до 6 лет по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, с 6 до 12 лет 1-2 чайных ложки (5-10 мл) 3 раза в сутки; взрослым и детям старше 12 лет по 2 чайных ложки (10 мл) 3 раза в сутки. **Отпуск из аптеки:** по рецепту. Полная информация представлена в инструкции по применению.

* Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Джосет®.

JC 07 0920



ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ»

127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1, каб. 609, тел.: 8 (495) 642-82-34, 8 (495) 642-82-35



**Изучение клинической
эффективности и безопасности
комбинированной терапии кашля
при остром бронхите у детей**



Клиническая эффективность и безопасность комбинированной терапии кашля при ОБ у детей*

Материалы и методы

121 ребенок в возрасте от 3 до 14 лет.

Лечение кашля проводилось на фоне базисной терапии, включавшей противовирусные препараты, по показаниям жаропонижающие и десенсибилизирующие средства. Антибактериальная терапия (при отсутствии бактериальных осложнений) не применялась.


Группа Джосет®

n=49: получали от кашля Джосет® (дозы, соответствующие возрасту).

Контрольная группа


n=72: получали от кашля комбинацию монопрепаратов – бронхолитик, отхаркивающее или/и муколик (дозы, соответствующие возрасту).

Динамика показателей функций внешнего дыхания у детей с бронхитами, имевших исходно сниженные показатели ФВД (%)



- При динамическом исследовании функции внешнего дыхания у детей, получавших Джосет®, **положительная динамика была выражена сильнее.**

Уменьшение частоты и интенсивности кашля



Динамика клинических данных синдрома кашля через 3 дня наблюдения

Группа Джосет®

- Уменьшение интенсивности и частоты кашля (59% с ОПБ и 74% с ООБ).
- У 65% детей кашель трансформировался в эффективный влажный.
- Купирование одышки на 3-й день.

Контрольная группа

- Наступление указанных выше эффектов в среднем на 1,5 дня позже.
- Купирование одышки на 4–5-й день.

Выводы

- При использовании препарата Джосет® удается быстрее достигнуть сокращения сроков одышки, уменьшения частоты и интенсивности кашля, трансформации кашля в эффективный влажный и улучшения ОФВ.
- Препарат Джосет® не оказывал побочного отрицательного воздействия на организм больного, хорошо переносился, токсических и аллергических реакций за время исследования не зарегистрировано.

ДЖОСЕТ®

Свобода дышать
без кашля

- Предупреждает приступ удушья*
- Уменьшает вязкость мокроты*
- Улучшает отхождение мокроты*
- Уменьшает раздражение слизистой дыхательных путей*



Краткая инструкция по применению препарата Джосет®. Рег. номер: ЛСР-001953/07. Лек. форма: сироп. Состав: 5 мл сиропа содержат: активные вещества: сальбутамол сульфат 1,205 мг (что эквивалентно сальбутамолу 1 мг), бромгексина гидрохлорид 2 мг, гвайфенезин 50 мг, ментол (левоментол) 0,5 мг; вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат 7,5 мг, натрия пропилпарагидроксибензоат 5,0 мг, сахара 2500,0 мг, сахароза 2500,0 мг, пропиленгликоль 625,0 мг, натрия сахаринат 5,0 мг, сорбиновая кислота 10,0 мг, глицерол 250,0 мг, лимонной кислоты моногидрат 1,4 мг, сорбитол (некристаллизующийся) жидкий 1315,0 мг, краситель закатно-желтый 0,15 мг, вода очищенная до 5 мл. **Фармакотерапевтическая группа:** отхаркивающее средство. **Показания к применению:** острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты: бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких, хроническая обструктивная болезнь легких, трахеобронхит, пневмония, пневмококкиоз, туберкулез легких. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав, тахикардия, миокардит, аортальный стеноз, декомпенсированный сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), желудочное кровотечение, беременность, период лактации, непереносимость фруктозы. **Побочные действия:** со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, обострения язвенной болезни, повышения активности печеночных трансаминаз (крайне редко). Со стороны ССС: тахикардия, снижение АД, коллапс. Со стороны мочевыделительной системы: окрашивание мочи в розовый цвет. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, парадоксальный бронхоспазм. **Способ применения и дозы:** внутрь. Детям: в возрасте до 6 лет по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, с 6 до 12 лет 1-2 чайных ложки (5-10 мл) 3 раза в сутки; взрослым и детям старше 12 лет по 2 чайных ложки (10 мл) 3 раза в сутки. **Отпуск из аптек:** по рецепту. Полная инструкция представлена в инструкции по применению.

* Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Джосет®.

ЖС 03 0920



ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ»

127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1, каб. 609, тел.: 8 (495) 642-82-34, 8 (495) 642-82-35

ДЖОСЕТ®

Свобода дышать
без кашля

- Предупреждает приступ удушья*
- Уменьшает вязкость мокроты*
- Улучшает отхождение мокроты*
- Уменьшает раздражение слизистой дыхательных путей*



Краткая инструкция по применению препарата Джосет®. Рег. номер: ЛСР-001953/07. Лек. форма: сироп. Состав: 5 мл сиропа содержат: активные вещества: сальбутамола сульфат 1,205 мг (что эквивалентно сальбутамолу 1 мг), бромгексина гидрохлорид 2 мг, гвайфенезин 50 мг, ментол (левоментол) 0,5 мг; вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат 7,5 мг, натрия пропилпарагидроксибензоат 5,0 мг, сахара 2500,0 мг, пропиленгликоль 625,0 мг, натрия сахаринат 5,0 мг, сорбиновая кислота 10,0 мг, глицерол 250,0 мг, лимонной кислоты моногидрат 1,4 мг, сорбитол (некристаллизующийся) жидкий 1315,0 мг, краситель закатоно-желтый 0,15 мг, вода очищенная до 5 мл. **Фармакотерапевтическая группа:** отхаркивающее средство. **Показания к применению:** острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты: бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких, хроническая обструктивная болезнь легких, трахеобронхит, пневмония, пневмококиоз, туберкулез легких. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав, тахикардия, миокардит, аортальный стеноз, декомпенсированный сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), желудочно-кровотечение, беременность, период лактации, непереносимость фруктозы. **Побочные действия:** со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, обострения язвенной болезни, повышения активности печеночных трансаминаз (крайне редко). Со стороны ССС: тахикардия, снижение АД, коллапс. Со стороны мочевыделительной системы: окрашивание мочи в розовый цвет. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, парадоксальный бронхоспазм. **Способ применения и дозы:** внутрь. Детям: в возрасте до 6 лет по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, с 6 до 12 лет 1-2 чайных ложки (5-10 мл) 3 раза в сутки; взрослым и детям старше 12 лет по 2 чайных ложки (10 мл) 3 раза в сутки. **Отпуск из аптек:** по рецепту. Полная информация представлена в инструкции по применению.

* Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Джосет®.

JC 04 0920

ДЖОСЕТ®



Острый бронхит в практике врача-педиатра



ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ»

127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1, каб. 609, тел.: 8 (495) 642-82-34, 8 (495) 642-82-35



ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ»

127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1, каб. 609, тел.: 8 (495) 642-82-34, 8 (495) 642-82-35

ОСТРЫЙ БРОНХИТ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА* (открытое клиническое исследование)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациенты: 60 детей в возрасте от 1 года до 5 лет
Диагноз: острый обструктивный бронхит легкой и средней тяжести

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ

Сироп Джосет® по 5 мл на прием 3 раза в день
У детей с массой тела до 10 кг: 0,5 мл препарата на 1 кг массы тела
(расчет по сальбутамолу)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

- Выраженность бронхообструкции
- Интенсивность кашля
- Частота кашля
- Трансформация кашля в продуктивный (приступообразность)

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА


- 0 – отсутствие признака
- 1 – выраженность минимальная
- 2 – выраженность умеренная
- 3 – выраженность максимальная

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЦЕНКИ

- 0-й визит – при поступлении в ЛПУ
- 1-й визит – 3-й день
- 2-й визит – 5-й день
- 3-й визит – 7-й день


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЖОСЕТА® ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ*

Выраженность бронхообструкции



- К 3-му дню терапии обструкция имела минимальную выраженность, позитивная динамика была выявлена у **91,1 %** детей
- К 5-му дню лечения бронхообструкция была купирована у **96,3 %** детей

Динамика клинических проявлений кашля



- У **63,7 %** детей уже к 3-му дню терапии отмечалось урежение кашля и уменьшение его интенсивности
- К 7-му дню терапии кашель у **87,2 %** детей был купирован, а в остальных случаях становился редким

Общие выводы

- Применение сиропа Джосет® отмечено быстрым регрессом бронхообструкции и других патологических проявлений без использования дополнительных лекарственных средств.
- Отсутствие побочных нежелательных явлений при использовании препарата Джосет®.
- Джосет® рекомендован для лечения ООБ как высокоэффективный препарат с хорошей переносимостью.

* Заплатников А.Л. и соавт. Острый бронхит в практике врача-педиатра: современные возможности эффективной терапии // Педиатрия. 2014. № 2.



**Рациональная фармакотерапия кашля
у взрослых с острыми и хроническими
bronхолегочными заболеваниями,
сопровождающимися нарушением
отхождения мокроты**



Рациональная фармакотерапия кашля у взрослых*

Цель исследования

Изучить эффективность и безопасность применения сиропа Джосет® для лечения кашля у взрослых с острыми и хроническими бронхолегочными заболеваниями, сопровождающимися нарушением отхождения мокроты.

Материалы и методы

50 пациентов с клиническими признаками острого или хронического бронхита, пневмонии различной локализации, сопровождающихся затруднением отхождения мокроты. Пациенты получали антибиотики, дезинтоксикационную терапию и сироп Джосет® в дозировке 10 мл на прием 3 раза в день.


Состояние участников оценивалось на 1-й, 3-й и 5-й день госпитализации: на 1-й и 5-й день оценивались общий анализ крови, общий анализ мокроты, общий анализ мочи.

На 1-й, 3-й и 5-й день проводилось исследование функции внешнего дыхания, пациенты самостоятельно заполняли опросник бальной оценки кашля (БОК).

Бальная шкала оценки дневного и ночного кашля			
Дневной кашель	Баллы	Ночной кашель	Баллы
Нет кашля	0	Нет кашля	0
Единичные кашлевые толчки	1	Кашель, не прерывающий сон	1
Редкий кашель в течение дня	2	Кашель, прерывающий сон не более 2 раз за ночь	2
Частый кашель, не влияющий на дневную активность	3	Кашель, прерывающий сон более 2 раз за ночь	3
Частый кашель, снижающий дневную активность	4	Частое прерывание сна	4
Тяжелый кашель, при котором невозможна дневная активность	5	Кашель, не дающий возможности заснуть	5


- Пациенты отмечали уменьшение частоты и интенсивности кашля в дневное время (с частого кашля, мешающего активности, до редкого) и ночное время (с кашля, часто прерывающего сон, до кашля, прерывающего сон не более 2 раз за ночь).
- Пациенты отмечали облегчение отхождения мокроты.

Результаты заполнения пациентами опросника БОК



- В показателях спирометрии на 5-й день отмечалась выраженная положительная динамика: увеличение показателей ОФВ1 (на 8,3%), ЖЕЛ (на 19,1%), ФЖЕЛ (на 9,5%).

Результаты исследования функции внешнего дыхания в динамике



ДЖОСЕТ®

Свобода дышать
без кашля



- Предупреждает приступ удушья*
- Уменьшает вязкость мокроты*
- Улучшает отхождение мокроты*
- Уменьшает раздражение слизистой дыхательных путей**

* Краткая инструкция Джосет® Актив. Рег. номер: ЛП-05532. Группировочное наименование: амброксол+гвайфенезин+салбутамол. Лек. форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Состав на 1 таблетку: действующие вещества: амброксола гидрохлорид – 30,0 мг; гвайфенезин – 100,0 мг; салбутамола сульфат – 2,4 мг (в пересчете на салбутамол 2,0 мг). Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство комбинированное. Показания к применению: в составе комбинированной терапии острых и хронических бронхолегочных заболеваний, сопровождающихся образованием трудно отделяемого вязкого секрета: трахеобронхит; острый и хронический бронхит; хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); бронхиальная астма; пневмония; эмфизема легких; коклюш; пневмокоиоз; туберкулез легких. Противопоказания: повышенная чувствительность к составляющим компонентам препарата, гиперчувствительность к производным сои и белку арахиса; беременность, период грудного вскармливания; тахикардия, миокардит, пороки сердца (в т. ч. аортальный стеноз), артериальная гипертензия; декомпенсированный сахарный диабет, гипертиреоз, глаукома; печеночная и/или почечная недостаточность; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, желудочно-кровоотечение; детский возраст до 18 лет. Способ применения и дозы: внутрь. Взрослым и детям старше 18 лет назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки. Побочные действия: нарушения со стороны иммунной системы: редко: реакции гиперчувствительности, кожная сыпь, крапивница; частота неизвестна: анафилактические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек и кожный зуд; нарушения со стороны ЦНС: редко: головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги; нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: редко: тахикардия, снижение артериального давления, периферическая вазодилатация, коллапс; частота неизвестна: ишемия миокарда; нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: редко: бронхоспазм (как признак реакции гиперчувствительности); нарушения со стороны ЖКТ: редко: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; нарушения со стороны почек и мочевыводительной системы: редко: возможно окрашивание мочи в розовый цвет; нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: частота неизвестна: тяжелые кожные побочные реакции, в том числе мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез; нарушения со стороны обмена веществ и питания: редко: гипокалиемия, гипергликемия. Отпуск из аптек: по рецепту. Полная информация представлена в инструкции по применению.

** Краткая инструкция по применению препарата Джосет®. Рег. номер: ЛПР-001953/07. Лек. форма: сироп. Состав: 5 мл сиропа содержат: активные вещества: салбутамола сульфат 1,205 мг (что эквивалентно салбутамолу 1 мг), бромгексина гидрохлорид 2 мг, гвайфенезин 50 мг, ментол (левоментол) 0,5 мг; вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат 7,5 мг, натрия пропилапарагидроксибензоат 5,0 мг, сахароз 2500,0 мг, пропиленгликоль 625,0 мг, натрия сахаринат 5,0 мг, сорбиновая кислота 10,0 мг, глицерол 250,0 мг, лимонной кислоты моногидрат 1,4 мг, сорбитол (некристаллизующийся) жидкий 1315,0 мг, краситель закатно-желтый 0,15 мг, вода очищенная до 5 мл. Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство. Показания к применению: острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты: бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких, хроническая обструктивная болезнь легких, трахеобронхит, пневмония, пневмокоиоз, туберкулез легких. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав, тахикардия, миокардит, аортальный стеноз, декомпенсированный сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), желудочно-кровоотечение, беременность, период лактации, непереносимость фруктозы. Побочные действия: со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, обострения язвенной болезни, повышения активности печеночных трансаминаз (крайне редко). Со стороны ССС: тахикардия, снижение АД, коллапс. Со стороны мочевыводящей системы: окрашивание мочи в розовый цвет. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, парадоксальный бронхоспазм. Способ применения и дозы: внутрь. Детям: в возрасте до 6 лет по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, с 6 до 12 лет 1-2 чайных ложки (5-10 мл) 3 раза в сутки; взрослым и детям старше 12 лет по 2 чайных ложки (10 мл) 3 раза в сутки. Отпуск из аптек: по рецепту. Полная информация представлена в инструкции по применению.

JS 06 9920



ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ»

127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1, каб. 609, тел.: 8 (495) 642-82-34, 8 (495) 642-82-35